



2021年汇英教育执业药师《中药综合知识与技能》预测卷（一）

一、最佳选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 下列关于气与血的关系说法错误的是（ ）

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 气为血之根

【答案】E

【解析】气与血之间的关系，概括为气为血之帅，血为气之母。气为血之帅即气能生血、气能行血、气能摄血。血为气之母是指血是气的载体，并给气以充分的营养，概括为血能载气和血能生气。

2. 为人体一切正常液体总称的是（ ）

- A. 精
- B. 经络
- C. 气
- D. 血
- E. 津液

【答案】E

【解析】津液，是体内各种正常水液的总称，包括各脏腑组织器官的内在体液及正常的分泌物，如胃液、唾液、肠液、关节液等。津液，也是构成人体和维持人体生命活动的基本物质。

3. 风性开泄所致的病症有（ ）

- A. 汗多
- B. 风痹
- C. 眩晕
- D. 抽搐
- E. 疼痛游走不定

【答案】A

【解析】风性开泄，导致汗多。

4. 同病异治的基本内涵是（ ）

- A. 病因不同
- B. 症状不同
- C. 证不同
- D. 转归不同
- E. 病不同

【答案】C

【解析】中医学的基本特点包括整体观念和辨证论治，其中辨证论治的原则包括“同病异治”和“异病同治”。前者指证异治亦异，后者指证同治亦同。

5. 临床常见的脾病影响肺病的病证，属于（ ）

- A. 相乘传变
- B. 子病犯母
- C. 母病及子
- D. 反克传变
- E. 相侮传变



【答案】C

【解析】脾对应五行为土，肺对应五行为金，根据五行相生规律土生金，土为母，金为子。因此，属于母病及子。

6. 属于外感病因的是（ ）

- A. 疔气
- B. 劳倦
- C. 痰饮
- D. 外伤
- E. 瘀血

【答案】A

【解析】病因是指引起人体疾病的原因，主要有六淫、疔气、七情内伤、饮食失宜、劳逸失当、痰饮、瘀血等。其中六淫、疔气具有外感性。

7. 用温远温根据的用药原则是（ ）

- A. 因时制宜
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 标本同治
- E. 治病求本

【答案】A

【解析】用温远温根据的用药原则是因时制宜。

8. 某男，22岁。今日突然高热寒战，周身酸痛，无汗，咳嗽，咽喉疼痛。舌红苔黄，脉浮数。周围人有相似症状，治宜选用的中成药是（ ）

- A. 双黄连口服液
- B. 败毒散
- C. 桑菊感冒片
- D. 感冒清热颗粒
- E. 银翘伤风胶囊

【答案】E

【解析】时行感冒可选择的中成药有：清瘟解毒片、连花清瘟胶囊、维C银翘片、银翘伤风胶囊。

9. 患者，女，42岁，症见心烦不寐，入睡困难，心悸多梦，伴头晕耳鸣，腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热，咽干少津，月经不调。舌红少苔，脉细数。其属于的证候是（ ）

- A. 肝火扰心
- B. 心胆气虚
- C. 痰热扰心
- D. 心脾两虚
- E. 心肾不交

【答案】E

【解析】心肾不交为心火旺盛及肾阴不足。心烦不寐为心火旺盛；潮热盗汗，五心烦热为肾阴不足。

10. 某女，35岁。胃脘胀痛，痛连两胁，遇烦恼则痛作，嗳气、矢气则舒，脘闷嗳气，善太息，大便不畅，舌淡红，苔薄白，脉弦。医生辨为肝气犯胃证，治宜选用的中成药是（ ）

- A. 木香槟榔丸
- B. 加味保和丸
- C. 左金丸
- D. 舒肝和胃丸
- E. 胃尔康片

【答案】D

【解析】肝气犯胃证可选用沉香化气丸、朴沉化郁丸、舒肝健胃丸、舒肝和胃丸、调胃舒肝丸等中成药。



11. 可辅助治疗湿热下注型男性不育症的中成药不包括（ ）

- A. 八正合剂
- B. 癃清片
- C. 热淋清颗粒
- D. 三金片
- E. 补中益气丸

【答案】E

【解析】湿热下注型男性不育症的辨证论治。可酌情选用治疗湿热下注淋证、癃闭、精浊的中成药，来辅助治疗此证候的男性不育症，这些中成药包括八正合剂、癃清片、热淋清颗粒、三金片、前列通片、五淋化石丸、癃闭舒胶囊、前列回春片、男康片等。

12. 某患儿，女，5岁，患厌食，症见面色萎黄，神疲多汗，大便稀薄，夹有未消化食物，形体偏瘦，肢倦乏力。治宜选用的方剂是（ ）

- A. 不换金正气散
- B. 养胃增液汤
- C. 健脾丸
- D. 保和丸
- E. 异功散

【答案】E

【解析】“神疲多汗，大便稀薄”可判断为脾胃气虚证。治宜选用的方剂是异功散加减。

13. 某女，49岁。精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，咽之不下，咯之不出。舌苔白腻，脉弦滑。医生诊断为郁证，其中医证候是（ ）

- A. 肝气郁结
- B. 心神失养
- C. 心脾两虚
- D. 痰气郁结
- E. 痰湿阻肺

【答案】D

【解析】“胁肋胀满”可判断气滞；“舌苔白腻”可判断痰浊。合在一起即为痰气郁结。

14. 疝瘕的治法应为（ ）

- A. 清利湿热，通络止痛
- B. 化痰祛瘀，滋养肝肾
- C. 清热解毒，养阴止痛
- D. 清热化湿，活血止痛
- E. 清热化湿，凉血止痛

【答案】B

【解析】疝瘕为久病，病久伤及肝肾出现肢体、关节疼痛，屈伸不利，关节肿大僵硬、变形，甚则肌肉萎缩，筋脉拘急，肘膝不伸，或以尻代踵，以背代头，伴腰膝酸软，骨蒸潮热，自汗、盗汗，舌红或淡，脉细数等虚象。治宜化痰祛瘀，滋养肝肾。

15. 患者渴喜冷饮、烦躁不安、便干尿黄、舌红苔黄，同时又见四肢厥冷、脉沉等症，应采用的治法是（ ）

- A. 缓则治本
- B. 以热制热
- C. 以寒治寒
- D. 寒者热之
- E. 虚则补之



【答案】C

【解析】阳盛格阴临床除见渴喜冷饮、烦躁不安、便干尿黄、舌红苔黄等症状外，又出现四肢厥冷、脉沉等假寒之象。因此患者属于真热假寒症状，应以寒治寒。寒因寒用即用寒性药物治疗具有假寒症状的病证，用于里热盛极、阳盛格阴、反见寒象的真热假寒证。

16. 藏医的五元学说不包括（ ）

- A. 土
- B. 水
- C. 空
- D. 金
- E. 风

【答案】D

【解析】五元即土、水、火、风、空五种物质元素。

17. 不属于蒙药传统剂型的是（ ）

- A. 酥油丸 B. 散剂
- C. 油剂 D. 灰剂
- E. 丸剂

【答案】A

【解析】蒙药的传统剂型共有8种，有汤剂、散剂、丸剂、膏剂、灰剂、油剂，还有搅全剂与酒剂。

18. 关于尿胆红素，说法正确的是（ ）

- A. 阳性可见于肝细胞性黄疸及阻塞性黄疸
- B. 阳性可见于化脓性扁桃体炎
- C. 阳性可见于急性胰腺炎
- D. 阳性可见于急性尿路感染
- E. 阳性可见于急性心肌梗死

【答案】A

【解析】尿胆红素:阳性可见于肝细胞性黄疸及阻塞性黄疸。

19. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考范围是（ ）

- A. 成人5~40U / L
- B. 成人8~40U / L
- C. 成人9~40U / L
- D. 成人12~40U / L
- E. 成人20~40U / L

【答案】B

【解析】血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考范围成人8~40U / L

20. 成书最早的本草学著作是（ ）

- A. 《黄帝内经》
- B. 《金匱要略》
- C. 《外台秘要》
- D. 《神农本草经》
- E. 《备急千金要方》

【答案】D

【解析】成书最早的本草学著作是《神农本草经》

21. 执业药师需要特别提醒的特殊情况是（ ）

- A. 患者购买贵重药品



- B. 患者购买非处方药
- C. 患者购买的药品近期发现有严重不良反应
- D. 患者购买长期维持治疗的药品
- E. 患者购买疗程治疗的药品

【答案】C

【解析】多药合用、不良反应（人）、依从性差、超剂量、超范围、配伍禁忌、首次使用、改说明、不良反应（药）、毒性成分、多用途、标识不清、贮藏效期。只有“患者购买的药品近期发现有严重不良反应”符合，属于不良反应（药）。

22. 妊娠期妇女慎服（ ）

- A. 白术
- B. 茯苓
- C. 红花
- D. 党参
- E. 陈皮

【答案】C

【解析】《中国药典》记载的妊娠慎用中药有：

《中国药典》记载的妊娠慎用中药有：人工牛黄、三七、大黄、川牛膝、制川乌、小驳骨、飞扬草、王不留行、天花粉、天南星、制天南星、天然冰片（右旋龙脑）、木鳖子、牛黄、牛膝、片姜黄、艾片（左旋龙脑）、白附子、玄明粉、西红花、肉桂、华山参、冰片（合成龙脑）、红花、芦荟、苏木、牡丹皮、体外培育牛黄、皂矾、没药、附子、苦楝皮、郁李仁、虎杖、金铁锁、乳香、卷柏、制草乌、草乌叶、枳壳、枳实、禹州漏芦、禹余粮、急性子、穿山甲、桂枝、桃仁、凌霄花、益母草、通草、黄蜀葵花、常山、硫黄、番泻叶、蒲黄、漏芦、赭石、薏苡仁、瞿麦、蟾酥。

23. 浸泡中药饮片的水温不宜超过（ ）

- A. 30℃
- B. 40℃
- C. 50℃
- D. 60℃
- E. 70℃

【答案】D

【解析】为便于煎出有效成分，在煎煮前先加冷水将饮片浸泡20~30分钟，使药材充分吸收水分。但不宜使用60℃以上的热水浸泡饮片，以免使药材组织细胞内的蛋白质遇热凝固，淀粉糊化，不利于药物成分的溶出。

24. 煎煮中药一般用水量宜高出药面（ ）

- A. 1~3cm
- B. 2~5cm
- C. 4~6cm
- D. 5~8cm
- E. 8~10cm

【答案】B

【解析】加水量多少受饮片的重量、质地等影响，煎煮中药一般用水量宜高出药面2~5cm，第二煎则应酌减。用于小儿内服的汤剂可适当减少用水量。注意在煎煮过程中不要随意加水或抛弃药液。

25. 调剂工作中的第一个环节是环节是（ ）

- A. 调配
- B. 计价
- C. 审方



D. 复核

E. 发药

【答案】C

【解析】调剂工作中的第一个环节是审方

26. 妊娠慎用的中成药是（ ）

A. 六味地黄丸

B. 女金丸

C. 香砂养胃丸

D. 四君子丸

E. 八珍丸

【答案】B

【解析】《中国药典》收载的妊娠慎用的中成药有：十香止痛丸、三妙丸、三黄片、万氏牛黄清心丸、万应胶囊、万应锭、山玫胶囊、川芎茶调丸、女金丸、马应龙八宝眼膏、马应龙麝香痔疮膏、天麻丸、木瓜分气丸、木香顺气丸、五虎散、少林风湿跌打膏、牛黄上清丸等。其余选项均不属于妊娠慎用药。

27. 处方写蜚虫，应付（ ）

A. 马钱子

B. 土鳖虫

C. 番泻叶

D. 海南子

E. 木鳖子

【答案】B

【解析】马钱子的别名有番木鳖、马前、马前子。土鳖虫的别名有地鳖虫、蜚虫、地鳖。

28. 驱虫药物宜（ ）

A. 饭前服用

B. 饭中服用

C. 饭后服用

D. 清晨服用

E. 空腹服用

【答案】E

【解析】一般药物--**饭后服**

滋补药--**饭前服**

驱虫和泻下药--**空腹服**

安眠药--**睡前服**

抗疟药--**在发作前1~2小时服用**

健胃药和对胃肠刺激性较大的药物--**饭后服**

29. 服用六味地黄丸，宜用的“药引”是（ ）

A. 黄酒

B. 姜汤

C. 淡盐水

D. 米汤

E. 清茶

【答案】C

【解析】六味地黄丸，宜用的“药引”是淡盐水

30. 医疗机构供应和调配毒性中药时，处方应保存（ ）



- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年
- E. 5年

【答案】B

【解析】医疗机构供应和调配毒性中药时，处方应保存2年

31. 最易虫蛀的中药饮片是（ ）

- A. 薏苡仁 B. 红花
- C. 佛手 D. 麻黄
- E. 川芎

【答案】A

【解析】淀粉、糖、脂肪、蛋白质等成分，是有利于蛀虫生长繁殖的营养物质，故含上述成分较多的饮片最易生虫，如白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、鸡内金等。

32. 因易泛油而需置阴凉干燥处贮存的饮片是（ ）

- A. 山药
- B. 苦参
- C. 半夏
- D. 当归
- E. 黄柏

【答案】D

【解析】含挥发油多的药材和饮片，如薄荷、当归、川芎、荆芥等，应置阴凉、干燥处贮存。

33. 门冬氨酸钾注射液治疗慢性重度肝炎，联用（ ）

- A. 麦门冬汤
- B. 十全大补汤
- C. 小柴胡汤
- D. 六味地黄丸
- E. 复方丹参注射液

【答案】E

【解析】复方丹参注射液联合门冬氨酸钾注射液治疗慢性重度肝炎，患者症状体征明显改善，肝功能恢复速率提高，治愈时间缩短，提高了临床治愈率。

34. 降血压的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等忌与哪类药物并用（ ）

- A. 含朱砂的中成药
- B. 含雄黄的中成药
- C. 含附子的中成药
- D. 含麻黄的中成药
- E. 含川乌的中成药

【答案】D

【解析】因麻黄中麻黄碱的化学结构与肾上腺素相似，能直接与肾上腺素受体结合，同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质，从而使血管收缩、血压升高。因此含麻黄的中成药忌与降血压的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等并用，若同时并用，可产生拮抗作用。

35. 可以和大活络丸联用的是（ ）

- A. 天麻丸
- B. 尪痹颗粒



- C. 纯阳正气丸
- D. 川贝枇杷露
- E. 蛇胆川贝液

【答案】C

【解析】

大活络丸、天麻丸、尪痹颗粒，均含附子，若大活络丸与其一合用会增加有毒药味的服用量，加大患者产生不良反应的危险性。

川贝枇杷露、蛇胆川贝液分别含有川贝和半夏，依据配伍禁忌原则，附子、乌头与川贝、半夏当属相反禁忌同用之列。

36. 可联合孟鲁司特钠治疗慢性持续期小儿哮喘痰热阻肺证具有协同增效的作用，且可降低孟鲁司特钠引起的不良反应的方剂是（ ）

- A. 小青龙汤
- B. 止嗽散
- C. 清燥救肺汤
- D. 百合固金汤
- E. 定喘汤

【答案】C

【解析】清燥救肺汤加减联合孟鲁司特钠治疗慢性持续期小儿哮喘痰热阻肺证具有协同增效的作用，且可降低孟鲁司特钠引起的过敏反应、皮疹、荨麻疹、烦躁、恶心呕吐、嗜睡的不良反应。

37. 丹参注射液与多巴胺同用属于（ ）

- A. 扩大适应范围
- B. 降低毒副作用
- C. 减少剂量
- D. 协同增效
- E. 减少禁忌

【答案】D

【解析】丹参注射液与间羟胺、多巴胺等升压药合用，不但能加强升压作用，还能减少对升压药的依赖性，属于协同增效。

38. 因服用过量而发生药物不良反应，可致呼吸麻痹而死亡的中药是（ ）

- A. 细辛
- B. 蓖麻子
- C. 吴茱萸
- D. 白矾
- E. 香加皮

【答案】A

【解析】细辛中的挥发油直接作用于中枢神经系统，最终可因呼吸中枢完全麻痹而致死。

39. 下列各中成药中，联合用药合理的是（ ）

- A. 更衣丸与消瘿丸
- B. 蛇胆川贝液与人参再造丸
- C. 金匱肾气丸与牛黄解毒片
- D. 心通口服液与通宣理肺丸
- E. 归脾丸与人参养荣丸

【答案】E

【解析】联合用药合理的是归脾丸与人参养荣丸



40. 过量服用可引起口舌、四肢、全身麻木等等中毒反应的中药是（ ）

- A. 乌头类中药
- B. 含马钱子的中成药
- C. 含雄黄的中成药
- D. 含蟾酥的中成药
- E. 含朱砂的中成药

【答案】A

【解析】乌头类的中毒表现

①神经系统：**口舌、四肢及全身麻木**、头痛、头晕、精神恍惚、语言不清或小便失禁，**继而四肢抽搐、牙关紧闭、呼吸衰竭等**。

②循环系统：心悸气短、心律失常、血压下降、面色苍白、口唇紫绀、四肢厥冷等。

③消化系统：**流涎**、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肠鸣音亢进。

二、配伍选择题（共50题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用。也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

[41—43]

- A. 热者寒之 B. 寒者热之
- C. 热因热用 D. 塞因塞用
- E. 通因通用

41. 用清利湿热药的方法治疗痢疾，其治则当属

【答案】E

42. 用温热性质的方药治疗寒证的方法，其治则当属

【答案】B

43. 用健脾药治疗脾虚便秘证，其治则当属

【答案】D

【解析】

通因通用是以通治通，即用通利的药物治疗具有实性通泄症状的病证。

寒者热之是指寒性病证出现寒象，用温热方药来治疗。即以**热药治寒证**。

塞因塞用是以补开塞，即用补虚药治疗具有闭塞不通症状的病证。

[44—46]

- A. 少气懒言 B. 胀闷疼痛
- C. 子宫脱垂 D. 心胸刺痛
- E. 昏厥吐血

44. 气陷证可见（ ）

【答案】C

45. 血瘀证可见（ ）

【答案】D

46. 气虚证可见（ ）

【答案】A

【解析】

气陷证可见头目昏花，少气倦怠，腹部有坠胀感，脱肛或子宫脱垂等。舌淡苔白，脉弱。

血瘀证可见局部肿胀疼痛，痛如针刺，拒按，痛处固定不移，常夜间加重，一般伴有面色晦暗，口唇色紫、舌有瘀



斑，口干但欲漱水不欲咽。

气虚证可见头晕目眩，少气懒言，疲倦乏力，自汗，活动时诸症加剧。舌淡，脉虚无力。

[47—48]

- A. 语无伦次，笑骂不定
- B. 语无伦次，神识不清，声高有力
- C. 语言重复，声低断续
- D. 语言错乱，错后自知
- E. 自言自语，见人则止

47. 患者郑声，可表现为

【答案】C

48. 患者谵语时，可表现为

【答案】B

【解析】

神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱者是**郑声**，属于心气大伤，精神散乱的虚证；

神识昏糊，胡言乱语，声高有力者是**谵语**，常见于热扰心神的实证；

[49—50]

- A. 高热烦渴，汗出蒸蒸
- B. 睡则汗出，醒后汗止
- C. 经常汗出，活动更甚
- D. 先全身战栗，继之汗出
- E. 大汗淋漓，四肢厥冷，脉微欲绝

49. 战汗的表现为

【答案】D

50. 自汗的表现为

【答案】C

【解析】

战汗的表现为先全身战栗，继之汗出

自汗的表现为经常汗出，活动更甚

[51—52]

- A. 脉来数急，一息七至以上
- B. 脉来流利，应指圆滑
- C. 脉来数急，一息五至以上
- D. 三部脉举按均有力
- E. 状如波涛汹涌，来盛去衰

51. 滑脉的脉象是

【答案】B

52. 洪脉的脉象是

【答案】E

【解析】

滑脉的脉象是应指圆滑，往来流利，如盘走珠。

洪脉的脉象是状如波涛汹涌，来盛去衰。

[53—54]

- A. 因时制宜
- B. 因人制宜
- C. 因地制宜



D. 因病制宜

E. 因证制宜

53. 小儿用量酌减，属于

【答案】B

54. 妊娠期禁用峻下、破血、有毒药物，属于

【答案】B

【解析】

小儿用量酌减，属于因人制宜。

妊娠期禁用峻下、破血、有毒药物，属于因人制宜。

[55—57]

A. 行痹 B. 痛痹

C. 着痹 D. 尪痹 E. 热痹

55. 关节疼痛游走不定者，属（ ）

【答案】A

56. 疼痛较剧，遇寒加重，得热痛减，属（ ）

【答案】B

57. 关节屈伸不利，关节肿大、僵硬、变形，甚则肌肉萎缩，属（ ）

【答案】D

【解析】

“游走不定”，可判断为风，风痹即“行痹”。

“遇寒加重”，可判断为寒，寒痹即“痛痹”。

“关节肿大、僵硬、变形”，可判断为“尪痹”。

[58—60]

A. 止嗽定喘口服液 B. 清肺消炎丸

C. 补金片 D. 橘红痰咳颗粒

E. 苓桂咳喘宁胶囊

58. 风寒闭肺喘证，宜选用的中成药是（ ）

【答案】E

59. 痰热郁肺喘证，宜选用的中成药是（ ）

【答案】B

60. 肾不纳气喘证，宜选用的中成药是（ ）

【答案】C

【解析】

喘证风寒闭肺证可选用小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒、苓桂咳喘宁胶囊、桂龙咳喘宁胶囊。

喘证痰热壅肺证可选用清肺消炎丸、葶贝胶囊。

喘证肾不纳气证可选用补金片。

[61—63]

A. 荆防败毒散 B. 消风散

C. 五味消毒饮 D. 桂枝麻黄各半汤

E. 防风通圣散

61. 风寒束表型瘾疹宜选用的方剂是（ ）

【答案】D

62. 风热犯表型瘾疹宜选用的方剂是（ ）

【答案】B



63. 胃肠湿热型瘾疹宜选用的方剂是（ ）

【答案】E

【解析】

风寒束表型瘾疹宜选用的方剂是桂枝麻黄各半汤。

风热犯表型瘾疹宜选用的方剂是消风散。

胃肠湿热型瘾疹宜选用的方剂是防风通圣散。

[64—66]

A. 地榆 B. 酸枣仁

C. 白术 D. 龟甲

E. 补骨脂

64. 处方直接写药名，需调配清炒品的是

【答案】B

65. 处方直接写药名，需调配麸炒品的是

【答案】C

66. 处方直接写药名，需调配烫制品的是

【答案】D

【解析】

清炒品：酸枣仁

麸炒品：白术

烫制品：龟甲

[67—69]

A. 酸枣仁、远志 B. 芦根、白茅根

C. 白梅花、佛手花 D. 防风、荆芥

E. 干姜、肉桂

67. 可编排在同一斗谱中的是

【答案】A

68. 需放在斗架最底层的是

【答案】B

69. 需放在斗架高层的是

【答案】C

【解析】

可编排在同一斗谱：酸枣仁、远志

需放在斗架最底层：芦根、白茅根

需放在斗架高层的是：白梅花、佛手花

[70-72]

A. 先煎 B. 后下

C. 包煎 D. 冲服

E. 烊化

65. 使用鹿角胶时应（ ）

【答案】E

66. 使用徐长卿时应（ ）

【答案】B

67. 使用三七时应（ ）

【答案】D



【解析】

胶类中药需要烱化（溶化），如阿胶、鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶等。

久煎后有效成分易被破坏的饮片需要后下。如钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶等。

贵细中药用量少，宜先研成粉末再用群药的煎液冲服，如雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、川贝、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇等。

[73—75]

- A. 寒凉药 B. 开窍药
C. 发汗药 D. 温热药
E. 涩肠止泻药

73. 湿热泄泻者忌用

【答案】E

74. 脱证者忌用

【答案】B

75. 表虚自汗者忌用

【答案】C

【解析】

湿热腹泄者忌用涩肠止泻药。

脱证者忌用开窍药。

表虚自汗者忌用发汗药。

[76—78]

- A. 苯妥英钠 B. 氢化可的松
C. 灰黄霉素 D. 甲基多巴
E. 三唑仑

76. 与甘草合用能协同抗变态反应的西药是（ ）

【答案】B

77. 与三黄泻心汤合用可增强疗效的西药是（ ）

【答案】E

78. 与石菖蒲、地龙与合用可增强抗癫痫的效果的西药是（ ）

【答案】A

【解析】

有糖皮质激素样作用的甘草与氢化可的松在抗炎、抗变态反应时同用，有协同作用。

逍遥散或三黄泻心汤等与西药镇静催眠药联用，既可提高对失眠症的疗效，又可逐渐摆脱对西药的依赖性。

石菖蒲、地龙与苯妥英钠等抗癫痫药联用，能提高抗癫痫的效果。

[79—81]

- A. 保阴煎 B. 百合地黄汤
C. 举元煎 D. 膈下逐瘀汤
E. 失笑散

79. 月经过多气虚证应选用的方剂有（ ）

【答案】C

80. 月经过多血热证应选用的方剂有（ ）

【答案】A

81. 月经后期血瘀证应选用的方剂有（ ）

【答案】E

【解析】



月经过多气虚证应选用的方剂是举元煎。

月经过多血热证应选用的方剂是保阴煎。

月经后期血瘀证应选用的方剂是失笑散。

[82—84]

- A. 胆宁片与妙济丸
- B. 附子理中丸与四神丸联用
- C. 二陈丸与平胃散联用
- D. 舟车丸与四君子丸联用
- E. 艾附暖宫丸和十香暖脐膏联用

82. 属于功效相似的中成药治疗同一种疾病的是

【答案】B

【解析】四神丸和附子理中丸治法均为补阳温中。

[82—84]

- A. 胆宁片与妙济丸
- B. 附子理中丸与四神丸联用
- C. 二陈丸与平胃散联用
- D. 舟车丸与四君子丸联用
- E. 艾附暖宫丸和十香暖脐膏联用

83. 属于功效不同，一药为主，一药为辅的配伍应用是

【答案】C

【解析】属于功效不同，一药为主，一药为辅的配伍应用是二陈丸与平胃散联用

[82—84]

- A. 胆宁片与妙济丸
- B. 附子理中丸与四神丸联用
- C. 二陈丸与平胃散联用
- D. 舟车丸与四君子丸联用
- E. 艾附暖宫丸和十香暖脐膏联用

84. 属于一种中成药能明显的抑制或消除另一种中成药的偏性和副作用的是

【答案】D

【解析】中成药能明显的抑制或消除另一种中成药的偏性和副作用的是舟车丸与四君子丸

[85—87]

- A. 红花 B. 阿胶
- C. 川芎 D. 黄芩
- E. 炙黄芪

85. 汁厚滋腻，易滞胃脘的中药是

【答案】B

86. 甘味过重，使气壅中满的中药是

【答案】E

87. 易耗气的中药是

【答案】C

【解析】

阿胶：汁厚滋腻，易滞胃脘

炙黄芪：甘味过重，使气壅中满

川芎：易耗气



[88—90]

- A. 升药 B. 砒霜
C. 蟾酥 D. 马钱子
E. 乌头

88. 追风丸中含有

【答案】E

89. 九分散含有

【答案】D

90. 六神丸含有

【答案】C

【解析】

乌头类药物：追风丸、追风透骨丸等。

马钱子及含马钱子的中成药：九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等。

蟾酥及含蟾酥：六神丸、六应丸、喉症丸、梅花点舌丸、麝香保心丸、麝香通心滴丸等。

三、综合分析选择题（共20题。每题1分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

[91—92]

患者，女，32岁。口舌生疮，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。

91. 其病位在（ ）

- A. 心、脾
B. 小肠
C. 膀胱
D. 心、肾
E. 肾、膀胱

【答案】D

【解析】心火亢盛：烦热口渴，失眠，舌烂生疮，尿黄而少，小便刺痛，或面红目赤，苔黄，脉数。

肾病辨证：腰膝酸软而痛，耳鸣耳聋，不育，水肿，二便异常。

92. 舌红少苔，脉细数，表明患者（ ）

- A. 肾阳虚
B. 脾气虚
C. 肾阴虚
D. 肝火旺盛
E. 肺热

【答案】C

【解析】肾阴虚：腰膝酸软，头昏耳鸣，五心烦热、面颊潮红，盗汗、失眠多梦，阳强遗精，脉细数。

[93—94]

患者，女，67岁。心悸、气短、自汗、活动或劳累后加重。兼见形寒肢冷，心胸憋闷，面色苍白，舌淡，脉细。

93. 该患者最可能的诊断是（ ）

- A. 心阳虚证
B. 心阴虚证
C. 心气虚证



D. 心血瘀阻证

E. 心阳虚脱证

【答案】A

【解析】心阳虚：除有心气虚的症状外，还表现为畏寒肢冷，面色灰滞，舌淡黯。心胸憋闷或作痛，遇冷加重，脉细或结代。

94. 脉细多因何所致（ ）

A. 阴寒内盛

B. 邪热炽盛

C. 阴液两伤

D. 血气壅滞不畅

E. 气血不足

【答案】E

【解析】脉细多因气血不足。

[95—98]

患者泄泻数年，症见大便时溇时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱。

根据病例回答以下问题。

95. 该患者应诊断为（ ）

A. 虚劳 B. 泄泻

C. 胃痛 D. 厌食

E. 呕吐

【答案】B

【解析】段落中第一个出现的就是病。

96. 该患者应辨为何证（ ）

A. 食滞肠胃

B. 肝气乘脾

C. 寒湿内盛

D. 脾胃虚弱

E. 湿热伤中

【答案】D

【解析】

脾胃虚弱

[症状]大便时溇时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱。

97. 针对此证，应采用的治法是（ ）

A. 消食导滞止泻

B. 温肾健脾，固涩止泻

C. 疏肝健脾止泻

D. 健脾益气，化湿止泻

E. 清热除湿止泻

【答案】D

【解析】

脾胃虚弱

【症状】大便时溇时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。



舌质淡，苔白，脉细弱。

【治法】健脾益气，化湿止泻。

98. 中成药应选用（ ）

- A. 四神丸
- B. 枳实导滞丸、
- C. 痛泻宁颗粒
- D. 参苓健脾胃颗粒
- E. 加味保和丸

【答案】D

【解析】

脾胃虚弱证

【症状】大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱。

【治法】健脾益气，化湿止泻。

【方剂应用】参苓白术散（莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、白扁豆、白茯苓、人参、甘草、白术、山药）加减。

【中成药应用】补中益气丸、人参健脾丸、参苓健脾胃颗粒。

[99—101]

患者，女，24岁。不寐，多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

99. 此证应辨为（ ）

- A. 痰热扰心
- B. 肝火扰心
- C. 心肾不交
- D. 心脾两虚
- E. 心胆气虚

【答案】B

【解析】

肝火扰心证

【症状】不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

100. 其治法应为（ ）

- A. 清化热痰，和中安神
- B. 疏肝泻火，镇心安神
- C. 补益心脾，养血安神
- D. 滋阴降火，交通心肾
- E. 益气镇惊，安神定志

【答案】B

【解析】

肝火扰心证

【症状】不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

【治法】疏肝泻火，镇心安神。

101. 治疗宜选用（ ）

- A. 乌灵胶囊
- B. 北芪五加片



- C. 礞石滚痰丸
- D. 泻肝安神丸
- E. 滋肾宁神丸

【答案】D

【解析】

肝火扰心证

【症状】不寐多梦，甚则彻夜不眠，急躁易怒，伴头晕头胀，目赤耳鸣，口干而苦，不思饮食，便秘溲赤。舌红苔黄，脉弦而数。

【治法】疏肝泻火，镇心安神。

【中成药应用】泻肝安神丸、复方罗布麻颗粒。

[102—105]

某中药贮藏仓库人员检查时发现多种中药饮片与中成药发生虫蛀、泛油、潮解、酸败等现象。

102. 易吸潮变软发黏的饮片是（ ）

- A. 当归
- B. 党参
- C. 牛膝
- D. 没药
- E. 芒硝

【答案】D

【解析】有些固体饮片，由于熔点较低，遇热则发黏而粘结在一起，使原来形态发生改变的现象，如芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶、天冬、熟地等。

103. 下列易泛油的中药饮片是（ ）

- A. 大黄
- B. 黄柏
- C. 黄芪
- D. 白芍
- E. 柏子仁

【答案】E

【解析】泛油又称走油，是指因饮片中所含挥发油、油脂、糖类等，在受热、受潮或贮藏保管不善时其表面返软、发黏、颜色变浑、呈现油状物质并发出油败气味的现象。如当归、苍术、柏子仁、桃仁、杏仁、牛膝、麦冬、天冬、熟地、黄精等

104. 易发霉的饮片是（ ）

- A. 秦艽
- B. 莪术
- C. 桔梗
- D. 柴胡
- E. 天冬

【答案】E

【解析】霉变是指饮片受潮后在适宜温度条件下，引发寄生在其表面或内部的霉菌大量繁殖，导致发霉的现象。如牛膝、天冬、马齿苋、菊花、蕲蛇、五味子、人参、独活、紫菀等。

105. 栓剂的贮藏温度应不超过（ ）

- A. 15℃
- B. 25℃
- C. 30℃



D. 45℃

E. 55℃

【答案】C

【解析】栓剂应在30℃以下密闭贮存。防止因受热、受潮而变形、发霉、变质。

[106—107]

患者，男，65岁。尿量急骤减少，有时闭塞不通，发热不退，口干欲饮，头痛身痛，烦躁不安，舌质红绛，苔黄干，脉数。经诊断为急性肾功能衰竭属热毒炽盛证。

106. 长期使用会造成肾功能衰竭的是（ ）

A. 天仙藤 B. 五倍子

C. 石榴皮 D. 川楝子

E. 黄药子

【答案】A

【解析】马兜铃酸中毒可致肾小管坏死，出现面部浮肿渐至全身水肿、尿频尿急，甚至出现急慢性肾功能衰竭及尿毒症而死亡。

107. 关于肾功能不全者用药的注意事项，不正确的是（ ）

A. 忌用有肾毒性的药物

B. 坚持少而精的用药原则

C. 可以长期使用某种药物，不必进行复查

D. 注意药物间相互作用

E. 明确疾病治疗目标

【答案】C

【解析】肾功能不全者要明确疾病诊断和治疗目标。忌用有肾毒性的药物，注意药物相互作用，避免产生新的肾损害，坚持少而精的用药原则，定期检查，及时调整治疗方案。

[108—110]

患者，女，23岁。患有喉痹，服用喉症丸后出现恶心，呕吐，胸闷，腹痛，心悸。经检查为喉症丸使用过量导致中毒反应。

108. 喉症丸主要毒性成分是（ ）

A. 儿茶酚胺

B. 肾上腺素

C. 去甲肾上腺素

D. 蟾酥毒素

E. 砷化物

【答案】D

【解析】喉症丸含蟾酥，主要毒性成分是强心苷（蟾酥毒素），还含有儿茶酚胺类化合物、肾上腺素、去甲肾上腺素等。

109. 含有该毒性成分的中成药还有（ ）

A. 天王补心丸 B. 九分散

C. 小活络丸 D. 追风丸

E. 麝香通心滴丸

【答案】E

【解析】含蟾酥的中成药为六神丸、六应丸、喉症丸、梅花点舌丸、麝香保心丸、麝香通心滴丸等。

110. 长期大剂量服用该成分引起中毒的机制是（ ）

A. 使心脏停止于收缩期

B. 兴奋中枢神经系统及血管运动中枢



- C. 抑制呼吸中枢及周围神经系统
- D. 损害肝细胞而发生黄疸
- E. 毒性成分可透过血-脑屏障，产生中枢中毒症状

【答案】A

【解析】蟾酥毒素有洋地黄样作用，小剂量能使心肌收缩力增强，大剂量则使心脏停止于收缩期。

四、多项选择题（共10题，每题1分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选、少选均不得分）

111. 奇经八脉包括（ ）

- A. 任脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 带脉
- E. 反关脉

【答案】ABCD

【解析】奇经八脉是督脉、任脉、冲脉、带脉、阳维脉、阴维脉、阴跷脉、阳跷脉的总称。

112. 风热犯肺之咳嗽，其治法有（ ）

- A. 疏风清热
- B. 疏散风寒
- C. 宣肺清热
- D. 宣肺止咳
- E. 止咳化痰

【答案】AD

【解析】风热犯肺的治法：疏风清热，宣肺止咳

113. 属补其不足的治疗方法是（ ）

- A. 清泻阳热法
- B. 滋阴法
- C. 温散阴寒法
- D. 泻下通便法
- E. 补阳法

【答案】BE

【解析】

阴阳偏衰——“补其不足”

阴虚不能制阳，常表现为阴虚阳亢的虚热证，应滋阴以制阳，这种治法为“**阳病治阴**”；

因阳虚不能制阴而致阴寒偏盛者，应补阳以制阴，这种治法为“**阴病治阳**”。

114. 可参考汗证进行辨证论治的西医病症有（ ）

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 结核病
- C. 风湿热
- D. 前列腺炎
- E. 虚脱

【答案】ABCE

【解析】西医学的甲状腺功能亢进、自主神经功能紊乱、风湿热、低血糖、虚脱、休克及结核病、肝病、黄疸等所致的以自汗、盗汗为主要表现者，可参考汗证内容辨证论治。

115. 胆经郁热型鼻渊常用的中成药有（ ）



- A. 利鼻片
- B. 鼻渊通窍颗粒
- C. 胆香鼻炎片
- D. 鼻渊舒口服液
- E. 藿胆片

【答案】CDE

【解析】胆经郁热证

【症状】脓涕量多，色黄或黄绿，或有臭味，鼻塞重，嗅觉差，鼻黏膜红赤。伴头痛较剧，口苦，咽干，目眩，耳鸣，耳聋，寐少梦多，烦躁易怒，小便黄赤。舌质红，舌苔黄或腻，脉弦数。

【治法】清胆泄热通窍。

【方剂应用】龙胆泻肝汤（龙胆、栀子、黄芩、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、生地黄、甘草）加减。

【中成药应用】鼻渊舒胶囊、藿胆丸、胆香鼻炎片。

116. 可见于口疮心脾积热证的症状有（ ）

- A. 口腔灼痛明显
- B. 口疮疼痛较轻
- C. 腰膝冷痛
- D. 口渴心烦
- E. 大便秘结

【答案】ADE

【解析】心脾积热证

【症状】口腔黏膜溃疡，灼痛明显，常因过食煎炒辛辣或少寐而发，伴口渴心烦、失眠、小溲短黄、大便秘结；检查见口腔黏膜表面有黄白色假膜，周边红肿。舌红，苔黄或腻，脉数有力。

117. 肝功能不全患者不用或慎用的中成药中，常含有（ ）

- A. 朱砂
- B. 雄黄
- C. 千里光
- D. 寻骨风
- E. 天仙藤

【答案】ABC

【解析】肝功能不全患者不用或慎用含有朱砂、雄黄、何首乌、千里光、黄药子等成分的中成药；肾功能不全患者不应服用含寻骨风、天仙藤、朱砂

莲、朱砂、雄黄、雷公藤等成分的中成药。

118. 不合理用药的表现是（ ）

- A. 辨证把握不准
- B. 用药剂量失准
- C. 疗程长短失宜
- D. 服用时间不当
- E. 浪费医药资源

【答案】ABCD

【解析】浪费医药资源属于后果。

119. 复方陈香胃片为含有西药组分的中成药。其功能为行气和胃，制酸止痛。用于脾胃气滞所致的胃脘疼痛、脘腹痞满、嗳气吞酸，胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎见上述证候者。其所含的西药成分包括（ ）

- A. 碳酸氢钠
- B. 重质碳酸镁



- C. 氢氧化铝
- D. 氧化镁
- E. 维生素U

【答案】ABC

【解析】复方陈香胃片含有的西药成分有碳酸氢钠、重质碳酸镁、氢氧化铝。

120. 含水合型鞣质而具肝毒的中药是（ ）

- A. 诃子
- B. 地榆
- C. 五倍子
- D. 四季青
- E. 白附子

【答案】ABCD

【解析】含水合型鞣质而对肝脏有一定毒性的诃子、五倍子、地榆、四季青等，

2021年汇英教育执业药师《中药综合知识与技能》预测卷（二）

一、最佳选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 在六腑中具有通行元气功能的是（ ）

- A. 小肠
- B. 胃
- C. 膀胱
- D. 三焦
- E. 大肠

【答案】D

【解析】三焦是上焦、中焦、下焦的合称。因其在人体脏腑中，唯它最大，又无脏与之相表里，故又有“孤府”之称。

三焦总的生理功能为主持诸气，总司人体的气机和气化，为元气运行的通路和水液运行的通道。

2. “无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”说明了阴阳之间的哪种关系（ ）

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 消长平衡
- D. 相互转化
- E. 相互依存

【答案】B

【解析】阴阳互用，即阴阳相互资生、相互促进的关系。即所谓“阳根于阴，阴根于阳，无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”。

3. 心对血液的主要作用是（ ）

- A. 藏血
- B. 统血
- C. 行血
- D. 防止出血
- E. 调节血量

【答案】C




【解析】心主血脉，有推动血液在脉管内运行的作用。肝藏血，指肝具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能；脾主统血，是指脾能统摄、控制血液，使之正常地循行于脉内，而不逸出脉外。

4. “肺病影响肾”体现五行的哪种关系（ ）

- A. 母病及子
- B. 子病及母
- C. 所胜
- D. 所不胜
- E. 相乘

【答案】A

【解析】



5. 属于急则治其标的是（ ）

- A. 慢性腹泻病人
- B. 表里同病
- C. 虚人外感
- D. 肺癆咳嗽
- E. 大出血病人

【答案】E

【解析】属于急则治其标的是大出血病人。

6. 中医诊断用以分辨邪正盛衰的纲领是（ ）

- A. 阴阳
- B. 表里
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

【答案】D

【解析】阴阳是区分疾病类型的总纲，表里用以分辨疾病病位与病势浅深，寒热用以分别疾病属性，虚实用以分别邪正的盛衰。

7. 肝气郁结最常见的症状是（ ）

- A. 脘腹胀满
- B. 矢气频频
- C. 便秘腹痛
- D. 呃逆暖气
- E. 两胁胀满

【答案】E

【解析】肝气郁结：两胁胀痛，胸闷不舒，善太息，神情沉默，不欲饮食，或见口苦善呕、头目眩晕，舌苔白滑，



脉弦。妇女月经不调、痛经或经前乳房作胀等

8. 突然出现片状脱发，多属（ ）

- A. 精血不足
- B. 血虚受风
- C. 肾精虚弱
- D. 肾虚
- E. 血热

【答案】B

【解析】突然出现片状脱发，显露圆形或椭圆形光亮头皮，称为斑秃，多为血虚受风所致。

9. 治疗风燥伤肺咳嗽首选的方剂是（ ）

- A. 银翘散
- B. 杏苏散
- C. 桑菊饮
- D. 参苏饮
- E. 桑杏汤

【答案】E

【解析】桑杏汤是风燥伤肺咳嗽的首选方剂。

10. 患者，男，67岁，小便不甚赤涩，淋漓不已，腰膝酸软，证属（ ）

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 劳淋
- D. 血淋
- E. 膏淋

【答案】C

【解析】劳淋症见小便不甚赤涩，淋漓不已，腰膝酸软是劳淋的症状。热淋的症状表现为小便频数短涩，灼热刺痛，溺色黄赤。石淋的症状表现为尿中有砂石，排尿涩痛，或排尿时突然中断。

11. 下列各症状中，属于癃闭肾阳衰惫证常用的方剂是（ ）

- A. 八正散
- B. 代抵挡丸
- C. 济生肾气丸
- D. 无比山药丸
- E. 石韦散

【答案】C

【解析】肾阳衰惫

[症状]小便不通或点滴不爽，排出无力，面色恍白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力。舌淡胖，苔薄白，脉沉细或弱。。

[治法]温补肾阳，化气行水。

[方剂应用]济生肾气丸（熟地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、牡丹皮、肉桂、附子、车前子、牛膝）加减。

[中成药选用]济生肾气丸、金匱肾气丸。

12. 瘀血引起的崩漏，治疗宜选用的治法是（ ）

- A. 以补开塞
- B. 以通治通
- C. 补气摄血
- D. 清热凉血



E. 热者寒之

【答案】B

【解析】通因通用是以通治通，即用通利的药物治疗具有实性通泄症状的病症，适用于实性通利的真实假虚证。瘀血引起的崩漏表现为经血非时而下，量多或少，淋漓不净，血色紫暗有块，小腹疼痛拒按，属于实性通利的真实假虚证。

13. 出现呼吸困难、神志昏迷等急重症状，应采用的治则是（ ）

- A. 实则泻之
- B. 标本兼治
- C. 虚则补之
- D. 急则治标
- E. 缓则治本

【答案】D

【解析】对于呼吸困难、神志昏迷这样的急重症状应先治其标。

14. 风寒闭肺之喘证治疗方剂宜选用（ ）

- A. 桑杏汤
- B. 清金化痰汤
- C. 金匱肾气丸
- D. 桑白皮汤
- E. 麻黄汤

【答案】E

【解析】喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。

【治法】宣肺散寒平喘。

【方剂应用】麻黄汤（麻黄、杏仁、桂枝、炙甘草）合华盖散（麻黄、杏仁、桑白皮、紫苏子、茯苓、陈皮）加减。

15. 患者，男，25岁，阳事不举，心情抑郁，胸胁胀满，善太息。舌苔薄白，脉弦，宜使用的方剂为（ ）

- A. 逍遥散
- B. 右归丸
- C. 大补元煎
- D. 六君子汤
- E. 四物汤

【答案】A

【解析】阳事不举，心情抑郁，胸胁胀满，善太息。舌苔薄白，脉弦，为阳痿肝郁不舒证的症状，治法为疏肝解郁，可应用逍遥散治疗。

16. 寒凝血瘀型痛经首选的方剂是（ ）

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 八珍汤
- E. 胶艾四物汤

【答案】A

【解析】寒凝血瘀证

【治法】温经散寒除湿，化瘀止痛。

【方剂应用】少腹逐瘀汤



17. 赫依属五元之（ ）

- A. 火
- B. 土
- C. 气
- D. 水
- E. 空

【答案】C

【解析】赫依、希日、巴达干为三根：其中赫依属五元之气，中性，是生命活动(包括语言思维)动力的支配者；希日属五元之火，是机体阳或热能的基物；巴达干属五元之土和水，是机体阴或寒性的基物。

18. 能清热解毒、消炎，用于小儿流感，脑炎的藏成药是（ ）

- A. 洁白丸
- B. 仁青常觉
- C. 志嘎汗散
- D. 八味沉香散
- E. 十一味金色丸

【答案】C

【解析】志嘎汗散：清热解毒，消炎。

19. 骨骼疾病下列哪项指标会出现明显升高

- A. 血清天门冬氨酸氨基转移酶（ ）
- B. 血清总蛋白
- C. 血清白蛋白
- D. 血清碱性磷酸酶
- E. 血清球蛋白

【答案】D

【解析】血清碱性磷酸酶升高见于肝胆疾病，骨骼疾病。

20. 糖化血红蛋白的正常参考值是（ ）

- A. 2 % ~ 3%
- B. 4 % ~ 6%
- C. 7 % ~ 9%
- D. 5 % ~ 10%
- E. 12 % ~ 15%

【答案】B

【解析】糖化血红蛋白的正常参考值是4 %~6%

21. 我国古代历史上收方最多的方书是（ ）

- A. 《千金翼方》
- B. 《普济方》
- C. 《太平圣惠方》
- D. 《太平惠民和剂局方》
- E. 《外台秘要》

【答案】B

【解析】《普济方》为明代朱橚等撰，是中国古代收方最多的方书。

22. 抗疟药宜服用的时间是（ ）

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 空腹服
- D. 睡前服



E. 发作前2小时服

【答案】E

【解析】一般药物宜在饭后服，滋补药宜饭前服，驱虫、泻下药宜空腹服，安眠药宜睡前服，抗疟药宜在发作前1-2小时服用，健胃药和对胃肠刺激性较大的药物宜饭后服。

23. 复核时，中药调剂每剂误差须小于（ ）

A. $\pm 1\%$

B. $\pm 2\%$

C. $\pm 4\%$

D. $\pm 5\%$

E. $\pm 10\%$

【答案】D

【解析】中药调剂每剂的重量误差应控制在 $\pm 5\%$ 以内，为方便核对，要按处方药味所列的顺序调配，间隔平放，不可混放一堆。

24. 久煎有效成分散失的芳香类饮片入煎时间为其他群药煎好前（ ）

A. 5~10分钟

B. 10~15分钟

C. 15~20分钟

D. 20~25分钟

E. 25~30分钟

【答案】A

【解析】芳香类因其含挥发性成分故不宜煎煮时间过久，以免其有效成分散失，一般在其他群药煎好前5~10分钟入煎即可。

25. 动物类药物如蛇类、虫类等宜与共贮的有（ ）

A. 花椒 B. 大枣

C. 山茱萸 D. 五味子

E. 决明子

【答案】A

【解析】蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮；蕲蛇或白花蛇与花椒或大蒜瓣同贮；土鳖虫与大蒜同贮。

26. 无水氯化钙的吸湿率可达（ ）

A. 20%~25%

B. 30%~50%

C. 50%~80%

D. 80%~100%

E. 100%~120%

【答案】E

【解析】无水氯化钙的吸湿率可达100%~120%

27. 与碱性中药同服可增强疗效的西药是（ ）

A. 四环素

B. 红霉素

C. 灰黄霉素

D. 克林霉素

E. 奎宁

【答案】B

【解析】碱性中药与苯唑西林、红霉素同服，可防止后者被胃酸破坏，增强肠道吸收，从而增强抗菌作用。



28. 下列药组中，属于协同增效的是（ ）

- A. 六君子汤与抗震颤麻痹药
- B. 小柴胡汤与丝裂霉素C
- C. 补中益气汤与抗肿瘤药
- D. 黄花夹竹桃与强心苷
- E. 黄药子与四环素

【答案】C

【解析】十全大补汤、补中益气汤、小柴胡汤等与西药抗肿瘤药联用，可以提高疗效。

29. 异烟肼可联用的中药是（ ）

- A. 人参汤
- B. 逍遥散
- C. 参芪扶正颗粒
- D. 八珍颗粒
- E. 人参养荣丸

【答案】B

【解析】中西药合理联用可提高疗效，降低化学药物的用量和毒副作用，缩短疗程和促进体质恢复等，显示了极大的优点。逍遥散有保肝作用，与西药抗结核药联用，能减轻西药抗结核药对肝脏的损害。

30. 含对乙酰氨基酚的中成药是（ ）

- A. 珍菊降压片
- B. 维C银翘片
- C. 重感冒灵片
- D. 咳特灵片
- E. 鼻炎康片

【答案】B

【解析】珍菊降压片成分有珍珠层粉、野菊花、槐花米、盐酸可乐定、氢氯噻嗪，有较好的降压及改善症状的作用。维C银翘片含马来酸氯苯那敏、对乙酰氨基酚、维生素C。重感冒灵片含马来酸氯苯那敏、安乃近。咳特灵片和鼻炎康片均含马来酸氯苯那敏。

31. 色甘酸钠可治疗哮喘，宜联用得中药是（ ）

- A. 麦门冬汤
- B. 十全大补汤
- C. 小柴胡汤
- D. 六味地黄丸
- E. 柴朴汤

【答案】E

【解析】小青龙汤、柴朴汤等与氨茶碱、色甘酸钠等联用，可提高对支气管哮喘的疗效。

32. 下列属于合理用药的药组是（ ）

- A. 附子理中丸和四神丸
- B. 大活络丸与天麻丸
- C. 尪痹颗粒与通宣理肺丸
- D. 利胆排石片与苏合香丸
- E. 蛇胆川贝液与天麻丸

【答案】A

【解析】附子理中丸和四神丸功效相似，协同增效。

33. 与莨菪碱合用，治疗病态窦房结综合征的是（ ）



- A. 生脉散
- B. 干姜汤
- C. 柴朴汤
- D. 小青龙汤
- E. 柴胡桂枝汤

【答案】A

【解析】生脉散、丹参注射液与莨菪碱合用，治疗病态窦房结综合征。

34. 护士用药咨询专有的问题是（ ）

- A. 药品价格
- B. 新药信息
- C. 药物相互作用
- D. 禁忌证
- E. 配液溶媒

【答案】E

【解析】护士用药咨询专有的问题是配液溶媒。

35. 治疗消化性溃疡，宜用丙谷胺联用（ ）

- A. 甘草、白芍、冰片
- B. 金银花、连翘
- C. 黄连、黄芩
- D. 黄柏
- E. 茵陈

【答案】A

【解析】

治疗消化性溃疡：

中：甘草、白芍、冰片

西：丙谷胺

36. 复方甘草口服液不宜用于哺乳期女性，因其含有（ ）

- A. 维生素C
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 安乃近
- D. 利福平
- E. 可待因

【答案】E

【解析】复方甘草口服液中含有可待因，其在乳汁中量小，但因哺乳量大，新生儿对这类药物特别敏感，以不用为好。

37. 不是引起乌头类药物中毒的原因是（ ）

- A. 药物生用
- B. 皮肤接触
- C. 服用过量
- D. 煎煮过短
- E. 与酒同服

【答案】B

【解析】引起乌头类药物中毒的原因有：①过量服用为主要原因。②用法不当，如煎煮时间太短或生用。③泡酒服用。④个体差异因其蓄积性中毒。



38. 服用过量可致土的宁惊厥，甚至角弓反张的有毒药物是（ ）

- A. 马钱子
- B. 雄黄
- C. 蟾酥
- D. 黄药子
- E. 朱砂

【答案】A

【解析】马钱子服用过量，初期出现头晕头痛、烦躁不安、面部肌肉紧张、吞咽困难，进而伸肌与屈肌极度收缩，土的宁惊厥，甚至角弓反张。

39. 过量服用，主要作用于神经系统，尤其是迷走神经的有毒中药是指（ ）

- A. 含雄黄的中成药
- B. 含乌头类药物
- C. 含蟾酥的中成药
- D. 含朱砂的中成药
- E. 含马钱子的中成药

【答案】B

【解析】乌头类药物过量服用时，主要是对神经系统，尤其是迷走神经等，使其先兴奋后抑制，并可直接作用于心脏，产生异常兴奋，可致心律失常，甚至引起室颤而死亡。

40. 不含雄黄的中成药是（ ）

- A. 牛黄解毒片
- B. 追风丸
- C. 牛黄镇惊丸
- D. 喉症丸
- E. 木瓜丸

【答案】E

【解析】木瓜丸的药物组成：制川乌、制草乌、白芷、海风藤、威灵仙、木瓜、鸡血藤、川芎、当归、人参、狗脊（制）、牛膝。

二、配伍选择题(共50题，每题1分。题目分为若干组。每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用。也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意)

[41—43]

- A. 易耗气伤津 B. 易损伤阳气
- C. 易袭阳位 D. 易袭阴位
- E. 易阻滞气机

41. 寒邪致病

【答案】B

42. 火邪致病

【答案】A

43. 风邪致病

【答案】C

【解析】

火为阳邪，其性炎上；火易伤津耗气；火易动血、生风；火易发引肿疡



①风为阳邪，其性开泄，易袭阳位 ②风邪善行数变 ③风为百病之长

[44—46]

A. 强硬舌 B. 瘦薄舌

C. 齿痕舌 D. 裂纹舌 E. 芒刺舌

44. 热入心包、痰浊内阻可见（ ）

【答案】A

45. 阴血亏虚可见（ ）

【答案】B

46. 脾虚湿盛可见（ ）

【答案】C

【解析】

强硬舌：若见于外感热病，多属热入心包、痰浊内阻，或高热伤津、邪热炽盛。见于杂病中者，多为中风征兆。

瘦薄舌：瘦薄而色淡者，多是气血两虚；瘦薄而色红绛且干，多是阴虚火旺、津液耗伤所致。

齿痕舌：多属脾虚。若舌质淡白而湿润，多为脾虚而寒湿壅盛。

[47—49]

A. 头晕眼花，肢麻震颤，舌强 B. 胁肋胀痛，纳呆尿黄，苔腻

C. 眩晕耳鸣，五心烦热，口干 D. 头痛眩晕，耳鸣耳聋，口干

E. 眩晕耳鸣，爪甲不荣，视力减退

47. 肝阴虚的常见症状是（ ）

【答案】C

48. 肝胆湿热证的常见症状是（ ）

【答案】B

49. 肝血不足的常见症状是（ ）

【答案】E

【解析】

肝阴虚：眩晕耳鸣，胁痛目涩，面部烘热，五心烦热，潮热盗汗，口咽干燥，手足蠕动，舌红少津，脉弦细数。抓住“五心烦热”即可。

肝胆湿热：胁肋满闷疼痛，黄疸，小便短赤，或小便黄而浑浊；或带下色黄腥臭，外阴瘙痒；或睾丸肿痛，红肿灼热；舌苔黄腻，脉弦数。抓住“尿黄，苔腻”即可。

肝血不足：抓住“爪甲不荣”即可。

[50-52]

A. 因人制宜 B. 因地制宜

C. 因时制宜 D. 既病防变

E. 未病先防

50. 用热远热属于（ ）

【答案】C

51. 女性用药考虑月经期的影响属于（ ）

【答案】A

52. 外感风寒在西北严寒地区，用辛温解表药量较重，属于（ ）

【答案】B

【解析】

因时制宜：用寒远寒、用凉远凉、用温远温、用热远热的基本原则。

因人制宜：根据病人年龄、性别、体质、生活习惯等不同特点，来考虑治疗用药的原则

因地制宜：外感风寒证，西北严寒地区，用辛温解表药量较重，常用麻桂



[53—55]

A. 都梁软胶囊 B. 芎菊上清丸

C. 通天口服液 D. 清脑降压片 E. 清眩丸

59. 可用于治疗证属风寒头痛型头痛的中成药是 ()

【答案】A

60. 可用于治疗证属肝阳上亢型头痛的中成药是 ()

【答案】D

61. 可用于治疗证属瘀血阻络型头痛的中成药是 ()

【答案】C

【解析】

可用于治疗证属风寒头痛的中成药是川芎茶调颗粒、天麻头痛片、都梁软胶囊。

可用于治疗证属肝阳上亢型头痛的中成药是天麻钩藤颗粒、脑立清丸、天麻首乌片、清脑降压片。

可用于治疗证属瘀血阻络型头痛的中成药是血府逐瘀口服液、逐瘀通脉胶囊、丹七片、通天口服液。

[56—57]

A. 柴胡疏肝散 B. 龙胆泻肝汤

C. 蒿芩清胆汤 D. 一贯煎

E. 血府逐瘀汤

65. 治疗胁痛肝郁气滞证，宜选用的方剂是 ()

【答案】A

66. 治疗胁痛肝络失养证，宜选用的方剂是 ()

【答案】D

【答案】

治疗胁痛肝郁气滞证，宜选用的方剂是柴胡疏肝散。

故疗胁痛肝络失养证，宜选用的方剂是一贯煎。

[58—59]

A. 知柏地黄丸 B. 皮肤病血毒丸

C. 连翘败毒丸 D. 活血解毒丸

E. 活血消炎丸

58. 热毒蕴结型疖宜选用的中成药是 ()

【答案】C

59. 湿毒瘀结型疖宜选用的中成药是 ()

【答案】B

【解析】

热毒蕴结证疖宜选用的中成药有连翘败毒丸、芩连片、如意金黄散、清热暗疮片、龙珠软膏。

湿毒瘀结型疖宜选用的中成药有皮肤病血毒丸、老鹳草软膏。

[60—61]

A. 寒凝血瘀 B. 气滞血瘀

C. 湿热瘀阻 D. 肝肾亏虚

E. 气血虚弱

60. 妇女经前小腹胀痛，经色紫暗有块者，证属 ()

【答案】B

61. 妇女经后小腹隐痛，面色无华，头晕心悸者，证属 ()

【答案】E

【解析】



“胀痛，紫暗有块”可判断为气滞血瘀证。

“隐痛，面色无华”可判断为气血虚弱证。

[62—64]

- A. 前言
- B. 前记
- C. 正文
- D. 后续
- E. 后记

62. 处方中中医诊断所处的位置是（ ）

【答案】B

【解析】**前记**

包括医疗机构名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号、科别或病区和床位号、中医临床诊断及开具日期等，并可添列特殊要求的项目。中医诊断，包括病名和证型（病名不明确的可不写病名），应填写清晰、完整，并与病历记载相一致。

[62—64]

- A. 前言
- B. 前记
- C. 正文
- D. 后续
- E. 后记

63. 处方分列药品名称、用量、用法的是（ ）

【答案】C

【解析】**正文：**以Rp或R标示，分列药品名称、数量、用量、用法，中成药还应当标明剂型、规格。

[62—64]

- A. 前言
- B. 前记
- C. 正文
- D. 后续
- E. 后记

64. 处方中药师签名处是在

【答案】E

【解析】**后记**

医师签名或者加盖专用签章，药品金额以及审核、调配、核财、发药药师签名或者加盖专用签章。

医疗机构的处方，按规定格式统一印制。不同的处方使用不同的颜色纸印刷。

[65—67]

- A. 牵牛子 B. 郁金
- C. 三棱 D. 石脂
- E. 五灵脂

65. 中药“十九畏”中丁香畏（ ）

【答案】B

66. 中药“十九畏”中官桂畏（ ）

【答案】D

67. 中药“十九畏”中牙硝畏（ ）

【答案】C



【解析】“十九畏”配伍禁忌：

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。

巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。

川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

[68—69]

- A. 栝楼
- B. 莎草根
- C. 草河车
- D. 仙灵脾
- E. 淡大芸

68. 重楼的别名是（ ）

【答案】C

69. 淫羊藿的别名是（ ）

【答案】D

【解析】

重楼：七叶一枝花 蚤休 草河车

淫羊藿：仙灵脾

[70—71]

- A. 清茶
- B. 鲜芦根煎汤
- C. 米汤
- D. 黄酒
- E. 淡盐水

70. 四神丸可用的药引是（ ）

【答案】C

71. 银翘解毒丸可用的药引是（ ）

【答案】B

【解析】

米汤作为药引送服的有脾胃虚弱，素有胃肠道疾患的患者服用更衣丸、麻仁丸、消渴丸、四神丸等，以及服用治疗身体衰弱的补益类中成药如十全大补丸、人参养荣丸等。

鲜芦根煎汤作为药引送服的有银翘解毒丸。

[72—74]

- A. 洋地黄、地高辛等强心药
- B. 硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、亚铁盐类
- C. 山楂、五味子、山茱萸
- D. 红霉素、氯丙嗪等具有肝毒性的药物
- E. 含碱性成分的中成药

72. 不能与黄药子同服的是

【答案】D

73. 不能与含雄黄类的中成药同服的是

【答案】B

74. 不能与蟾酥联用的是

【答案】A

【解析】



黄药子对肝脏有一定毒性，不可与**利福平、四环素、红霉素、氯丙嗪**等本身也具有肝毒性的西药联用，以免引发药源性肝病。

含**雄黄类**的中成药，不能与**硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐及亚铁盐类西药**合服，生成硫化砷酸盐沉淀物。

含有**蟾酥、罗布麻、夹竹桃**等强心苷成分的中成药（六神丸、救心丹等），不宜与**洋地黄、地高辛、毒毛旋花苷K**等强心苷类同用。

[75—77]

- A. 破气药 B. 淡渗利湿药
C. 寒凉药 D. 涩肠止泻药
E. 开窍药

75. 阳虚里寒者忌用（ ）

【答案】C

76. 阴虚津亏者忌用（ ）

【答案】B

77. 湿热泻痢者忌用（ ）

【答案】D

【解析】

阳虚里寒者忌用寒凉药；

阴虚津亏者忌用淡渗利湿药；

湿热泻痢者忌用涩肠止泻药。

[78—80]

- A. 苦楝皮 B. 蜈蚣
C. 天仙子 D. 洋金花 E. 苍耳子

78. 根据《中国药典》，内服剂量为3～6g的中药是（ ）

【答案】A

79. 根据《中国药典》，内服剂量为0.06～0.6 g 的中药是（ ）

【答案】C

80. 根据《中国药典》，外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速者禁用的中药是（ ）

【答案】D

【解析】

苦楝皮有毒，内服3～6g。外用适量，研末，用猪脂调敷。肝肾功能不全者慎用。

天仙子有大毒，内服0.06～0.6 g。心脏病、心动过速、青光眼者禁用。

洋金花有毒，内服0.3～0.6g，宜入丸散；亦可做卷烟分次燃吸（不超过1.5g/d）外用适量。外感及痰热咳喘、青光眼、高血压及心动过速者禁用。

[81—82]

- A. 合剂
B. 芳香水剂
C. 胶囊剂
D. 胶剂
E. 膏滋剂

81. 易出现霉变的是

【答案】E

82. 易挥发的是

【答案】B

【解析】



霉变---**蜜丸、膏滋、片剂**

挥发---**芳香剂、酊剂**

[83—85]

- A. 黄精、骨碎补、甘草 B. 柴胡桂枝汤
- C. 加味逍遥散 D. 竹茹温胆汤
- E. 香连化滞丸

83. 与抗生素联用可增强抗菌作用的是（ ）

【答案】D

84. 与西药抗癫痫药联用可减少抗癫痫药的用量的是（ ）

【答案】B

85. 与链霉素联用，可消除链霉素引发的耳鸣、耳聋等不良反应的是（ ）

【答案】A

【解析】

清肺汤、竹叶石膏汤、竹茹温胆汤、六味地黄丸等与**抗生素类药**联用，有增强抗生素治疗呼吸系统反复感染的效果。

柴胡桂枝汤等具有抗癫痫作用的中药复方与西药**抗癫痫药**联用，可**减少**抗癫痫药的用量及**肝损害、嗜睡**等副作用。

黄精、骨碎补、甘草等与**链霉素**联用，可消除或减少链霉素引发的**耳鸣、耳聋**等不良反应。

[86—88]

- A. 宜佐健脾和胃、凉肝定惊之品
- B. 忌用有肾毒性的药物
- C. 忌用有肝毒性的药物
- D. 应慎用在母乳中浓度高的中药
- E. 使用阿胶、熟地等应酌情减量

86. 老年人中药的使用应做到（ ）

【答案】E

87. 肾功能不全患者中药的使用最应注意的是（ ）

【答案】B

88. 婴幼儿患者中药的使用应（ ）

【答案】A

【解析】肾功能不全患者中药的使用最应注意的是忌用有肾毒性的药物。

婴幼儿患者合理应用中药的原则

(1)**用药及时，用量宜轻。**

(2)宜用**轻清之品**。银翘散、桑菊饮

(3)宜佐**健脾和胃**之品：山药、山楂、陈皮、六神曲。

(4)宜佐**凉肝定惊**之品：钩藤、蝉蜕、僵蚕、地龙。

(5)**不宜滥用滋补之品。**

[89—90]

- A. 蟾酥中毒症状
- B. 乌头类药物中毒症状
- C. 汞中毒症状
- D. 马钱子中毒症状
- E. 雄黄中毒症状

89. 三品应用不当可引起（ ）



【答案】E

90. 舒筋丸应用不当可引起（ ）

【答案】D

【解析】

雄黄及含雄黄的中成药：牛黄解毒丸（片）、六神丸、喉症丸、三品等。

马钱子及含马钱子的中成药：九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等。

三、综合分析选择题（共20题，每题1分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

[91—93]

患者，男，65岁，久咳不已，短气乏力，痰多清稀，心悸气短，苔白舌淡，脉细弱。根据脏腑辨证，回答以下问题。

91. 该病应辨证为（ ）

- A. 心肺两虚
- B. 心脾两虚
- C. 心肾不交
- D. 肺脾两虚
- E. 肝火犯肺

【答案】A

【解析】久咳不已一肺、气短心悸一心。

92. 其中心的定位症状是（ ）

- A. 久咳不已
- B. 短气
- C. 痰多清稀
- D. 心悸气短
- E. 乏力

【答案】D

【解析】心的定位症状是心悸。

93. 根据八纲辨证，该证属于（ ）

- A. 表证
- B. 实证
- C. 热证
- D. 寒证
- E. 虚证

【答案】E

【解析】虚证：精神萎靡，身倦乏力，气弱懒言。舌淡嫩，少苔，脉细弱。

[94—96]

患者，男，65岁，排尿不畅3年，加重1个月，小便点滴而出，烦躁口苦，舌紫暗，苔黄腻，脉涩。

94. 该病应诊为（ ）

- A. 淋证 B. 虚劳
- C. 癃闭 D. 消渴
- E. 阳痿



【答案】C

【解析】癃闭是以小便量少，排尿困难，甚则小便闭塞不通为主症的一种病证。

95. 该病辨证为（ ）

- A. 膀胱湿热
- B. 风水相搏
- C. 湿热瘀阻
- D. 肾阳衰惫
- E. 水湿浸渍

【答案】C

【解析】

湿热瘀阻

[症状]小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点，苔黄腻，脉涩。

96. 方剂应选用（ ）

- A. 济生肾气丸
- B. 代抵当汤
- C. 八正散
- D. 越婢加术汤
- E. 五皮散

【答案】B

【解析】

湿热瘀阻：

[症状]小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点，苔黄腻，脉涩。

[治法]行瘀散结，通利水道。

[方剂应用]代抵当汤。

[97—99]

患者，女，30岁，月经漏下不止，经血色暗伴有血块已有2个月，小腹疼痛拒按，时见乏力倦怠，舌边尖有瘀点，脉涩。

97. 对其应采用的治则是（ ）

- A. 祛邪
- B. 扶正
- C. 扶正与祛邪兼用
- D. 先扶正后祛邪
- E. 先祛邪后扶正

【答案】E

【解析】先祛邪后扶正：适用于虽为邪盛正虚，但正气尚能耐攻，或同时兼顾扶正反会助邪的病证，则应先祛邪而后扶正。如瘀血所致的崩漏证，瘀血不去，则崩漏难止，故应先用活血祛瘀法，然后补血。

98. 此病辨证为（ ）

- A. 气血两虚
- B. 脾不统血
- C. 肝肾不足
- D. 湿热带下
- E. 瘀血阻络

【答案】E

【解析】瘀血阻络的症状：经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏



下，经色暗有血块；舌质紫暗或尖边有瘀点，脉弦细或涩。

99. 疼痛的临床意义中瘀血疼痛常为（ ）

- A. 胀痛 B. 刺痛
- C. 重痛 D. 绞痛
- E. 灼痛

【答案】B

【解析】瘀血病症的共同特点有疼痛、肿块、出血。疼痛多为刺痛，痛处固定不移，拒按，夜间痛甚。刺痛即疼痛如针刺，是瘀血疼痛的特点之一，以胸胁、少腹、小腹、胃脘部出现为多。

[100—104]

患者，男，55岁。因右肩周疼痛复发，求诊于中医，患者自述已有10年病史。经检查，该患者右肩周压痛明显，且右臂外展功能受阻，肢体重着，活动不利，苔白腻，脉濡滑。

100. 关于此病，宜用的治法是（ ）

- A. 温经散寒，祛风除湿
- B. 祛风通络，散寒除湿
- C. 化痰祛瘀，滋养肝肾
- D. 除湿通络，祛风散寒
- E. 清热利湿

【答案】D

【解析】

着痹

[症状]肢体关节酸痛、重着，患处肿胀，痛有定处，手足沉重，活动不利，肌肤麻木不仁。苔白腻，脉濡滑。

[治法]除湿通络，祛风散寒。

101. 根据六邪致病的特点，湿邪容易出现的病症是（ ）

- A. 汗出恶风
- B. 筋脉挛急
- C. 疼痛游走不定
- D. 吐血衄血
- E. 肢体重着

【答案】E

【解析】湿邪容易出现的病症是肢体重着。

102. 给上述患者开风湿痹康胶囊，患者服至第4次时，出现了药物不良反应，症见角弓反张，伸肌与屈肌同时做极度收缩，是哪种药物的不良反应（ ）

- A. 乌头类药物中毒
- B. 含马钱子药物中毒
- C. 含蟾酥药物中毒
- D. 含雄黄药物中毒
- E. 含朱砂药物中毒

【答案】B

【解析】马钱子及含马钱子的中毒表现：初期出现头晕、头痛、烦躁不安，面部肌肉紧张，**吞咽困难**；进而伸肌与屈肌同时做极度收缩。发生典型的**土的宁惊厥、痉挛，甚至角弓反张**，可因呼吸肌痉挛窒息或心力衰竭而死亡。

103. 解救措施错误的是（ ）

- A. 患者避免声音、光线刺激
- B. 清除毒物，洗胃、导泻
- C. 痉挛时可静注苯巴比妥钠
- D. 肉桂或甘草煎汤内服



E. 静脉注射激素5mg

【答案】E

【解析】马钱子及含马钱子的中毒解救

①病人需保持安静，**避免声音、光线刺激**(因外界刺激可引发惊厥痉挛)，吸氧。

②清除毒物，洗胃、导泻。较大量的静脉输液，以加快排泄。

③对症治疗，痉挛时可静注**苯巴比妥钠**0.2~0.3g。

④中药治疗可用**肉桂煎汤或甘草煎汤**饮服。

104. 含有上述毒性中药的其他中药还有（ ）

A. 疏风定痛丸

B. 木瓜丸

C. 牛黄清心丸

D. 六应丸

E. 速效救心丸

【答案】A

【解析】马钱子及含马钱子的中成药：九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等。

[105—108]

患者烦热，尿清长，头晕咽干，面浮红如妆，下肢厥冷，舌淡脉弱。

105. 其临床意义是何证（ ）

A. 寒热错杂证

B. 阳盛格阴证

C. 阴盛格阳证

D. 里实寒证

E. 里虚寒证

【答案】C

【解析】尿清长、下肢厥冷、舌淡脉弱等症状说明患者阴寒内盛，头晕咽干、面浮红如妆则是阳浮于外的假热之象，辨证为阴盛格阳证。

106. 此证也称为（ ）

A. 阳虚则外寒

B. 阴虚则内热

C. 真热假寒

D. 真寒假热

E. 阴阳转化

【答案】D

【解析】热因热用是以热治热，即用热性药物治疗具有假热症状的病证。适用于阴寒内盛，格阳于外，反见热象的**真寒假热证**。

107. 此证治宜（ ）

A. 以热制热

B. 以寒治寒

C. 塞因塞用

D. 通因通用

E. 寒者热之

【答案】A

【解析】热因热用是以热治热，即用热性药物治疗具有假热症状的病证，适用于阴寒内盛，格阳于外，反见热象的**真寒假热证**。寒因寒用是以寒治寒，即用寒性药物治疗具有假寒症状的病证，适用于里热盛极，阳盛格阴，反见寒



象的真真假寒证。塞因塞用是以补开塞，即用补虚药治疗具有闭塞不通症状的病证，适用于因虚而闭阻的真虚假实证。通因通用是以通治通，即用通利的药物治疗具有实性通泄症状的病证，适用于实性通利的真实假虚证。

108. 属于正治的是（ ）

- A. 以寒治寒
- B. 热因热用
- C. 用寒远寒
- D. 以补开塞
- E. 以热治寒

【答案】E

【解析】正治是指采用与疾病的证候性质相反的方药以治疗的一种常用治疗法则。寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之。

[109—110]

患者，女，33岁，月经紊乱，量多，腰痛，伴有咳嗽。开处方如下：熟地、山药、山茱萸、枸杞子、附子、枇杷叶。

109. 处方中需调配炮制品的是（ ）

- A. 山药
- B. 枸杞子
- C. 马兜铃
- D. 山茱萸
- E. 附子

【答案】E

【解析】处方直接写药名(或制)，需调配炮制品，如草乌(水制)、川乌(水制)、天南星(矾制)、附子(炮制)、吴茱萸(甘草水制)等。

110. 处方中需调配蜜炙品的是（ ）

- A. 山药
- B. 枸杞子
- C. 枇杷叶
- D. 山茱萸
- E. 附子

【答案】C

【解析】处方直接写药名(或炒或炙)，需调配蜜炙品，如枇杷叶、马兜铃等。

四

四、多项选择题（共10题。每题1分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选、少选均不得分）

111. 虚证临床可见到（ ）

- A. 五心烦热
- B. 脉虚无力
- C. 面色苍白或萎黄
- D. 水湿泛滥
- E. 心悸气短

【答案】ABCE

【解析】虚证有阴虚、阳虚、气虚、血虚等多种证候的不同，所以临床表现亦极不一致，很难概括全面。常见的有：面色苍白或萎黄，精神萎靡，神疲乏力，心悸气短，形寒肢冷或五心烦热，自汗盗汗，大便滑脱，小便失禁，舌少苔无苔，脉虚无力等。瘀血和水湿均属于实邪。

112. 血液的生成、输布，依赖于气的（ ）

- A. 推动作用



- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

【答案】ABD

【解析】推动作用：气是活动能力极强的精微物质；发挥激发和推动作用。

推动：人体生长发育；各脏腑组织器官的功能活动；血液的循行；津液的生成输布和排泄

温煦作用：血和津液之所以能保持液态在体内不停地运行，依靠气的温煦作用，方不致凝聚，故古人说“血得温则行，得寒则凝”。

固摄作用：对于精、血、津液等物质具有防止其无故流失；

113. 疼痛的性质包括（ ）

- A. 刺痛
- B. 重痛
- C. 绞痛
- D. 胀痛
- E. 隐痛

【答案】ABCDE

【解析】由于引起疼痛的病因、病机不同，故疼痛的性质特点也不同：了解疼痛的不同性质特点，有助于分辨疼痛的原因与病机。疼痛的性质包括胀痛、重痛、刺痛、绞痛、灼痛、冷痛、隐痛、掣痛。

114. 胸痹之气虚血瘀证可选的方药是（ ）

- A. 参桂胶囊
- B. 芪参益气滴丸
- C. 心力丸
- D. 活心丸
- E. 血府逐瘀口服液

【答案】ABCD

【解析】胸痹之气虚血瘀的中成药选用：参桂胶囊、芪参益气滴丸、心力丸、活心丸

115. 不寐之心脾两虚证，可选择的用药有（ ）

- A. 天王补心丸
- B. 北芪五加片
- C. 养血安神丸
- D. 眠安宁口服液
- E. 脑力静糖浆

【答案】BDE

【解析】不寐之心脾两虚的中成药选用：北芪五加片、眠安宁口服液、脑力静糖浆。

116. 宜密闭贮藏的种子类饮片有（ ）

- A. 紫苏子
- B. 莱菔子
- C. 薏苡仁
- D. 扁豆
- E. 巴豆

【答案】ABCD

【解析】种子类药材因炒制后增加了香气，如紫苏子、莱菔子、薏苡仁、扁豆等，若包装不坚固易受虫害及鼠咬，故应密闭贮藏于缸、罐中。

117. 含挥发油，长期与空气接触，其气味会随之减弱，在温度较高时，会加速挥发的饮片有（ ）

- A. 荆芥



- B. 薄荷
- C. 当归
- D. 白芷
- E. 黄精

【答案】ABCD

【解析】白芷、当归、荆芥、薄荷、肉桂、樟脑、姜黄、山柰等，长期与空气接触，其气味会随之减弱，在温度较高时，会加速挥发。

118. 含氰苷类中药有（ ）

- A. 桃仁
- B. 杏仁
- C. 枇杷叶
- D. 紫苏叶
- E. 番泻叶

【答案】ABC

【解析】含氰苷类中药，包括苦杏仁、桃仁、枇杷叶等，不宜长期与镇咳类的西药如喷托维林等联用。银杏叶含有黄酮类成分，番泻叶含有番泻叶苷等成分。

119. 婴幼儿患者合理使用中药的原则是（ ）

- A. 不宜滥用滋补之品
- B. 宜佐凉肝定惊之品
- C. 宜佐健脾和胃之品
- D. 宜用轻清之品
- E. 用药及时，用量要轻

【答案】ABCDE

120. 引起肝损伤的含汞类中药有（ ）

- A. 白降丹
- B. 轻粉
- C. 银朱
- D. 红粉
- E. 朱砂

【答案】ABCDE

【解析】引起肝损伤的含汞类中药有朱砂、银朱、红粉、轻粉、白降丹等。